

**NAMA OBAT-OBATAN UMUM DI UNIT  
POLITEKNIK TRANSPORTASI  
2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA OBAT</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KEGUNAAN</b>
1	Acyclovir Salp	Tube	obat luar untuk mengatasi luka lepuh dikulit akibat virus herpes
2	Acyclovir Tab 400 mg	Strip	obat untuk mengatasi infeksi virus seperti cacar air serta penyakit herpes
3	Alcohol 70%	Botol	mensterilkan daerah permukaan kulit atau benda lainnya
4	Alcohol Swab	Pcs	mensterilkan daerah permukaan kulit
5	Alleron	Strip	obat untuk mengatasi gejala alergi
6	Allopurinol 100 mg	Strip	di gunakan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah akibat penyakit asam urat
7	Ambeven	Strip	untuk membantu meringankan gejala wasir
8	Ambroxol	Strip	obat yang berfungsi unyuk mengencerkan dahak
9	Amlodipin 5 mg	Strip	obat untuk mengatasidarah tinggi atau hipertensi

10	Amlodipine 10 mg	Strip	obat untuk mengatasidarah tinggi atau hipertensi
11	Anastan	Strip	obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri
12	Antangin Cair	Sachet	meredakan masuk angin
13	Alumy	Botol	membantu meringankan rasa tidak nyaman di lambung karena asam lambung yang berlebihan
14	Amoxicilin 500mg	Strip	obat yg digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri
15	Anadium	Strip	mengurangi gejala hemoroid, nyeri dan edema tungkai
16	Anti Haemoroid	pcs	digunakan untukmengobati wasir yang di sertai dengan pendarahan, luka terbuka pada dubur
17	Aquabides	Pcs	mencampurkan cairan untuk pengisian O2
18	Asam Mefenamat	Strip	obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri

19	Abocavt	Pcs	alat bantu untuk masukan terapi obat dalam vena
20	Antimo	Strip	obat ini digunakan untuk meringankan gejala mabuk saat perjalanan
21	Becom C	Strip	untuk membantu memenuhi kebutuhan multi vitamin pada masa pertumbuhan
22	Balsem Geliga	Tube	meringankan pegal-pegal dibadan
23	Betadine 1L	Botol	bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit seperti luka gores atau luka ringan
24	Betadine 15 ml	Pcs	bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit seperti luka gores atau luka ringan
25	Betadine Salp	Tube	bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit seperti luka gores atau luka ringan
26	Bedak Salicil	Pcs	digunakan untuk meringankan gatal akibat biang keringat
27	Betahistin	Strip	obat untuk meredakan keluhan vertigo
28	Burnazin Salp	Tube	digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi pada luka bakar
29	bufacomb Salp	Tube	obat luar untuk mengatasi sariawan
30	Bufacort Salp	Tube	bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit seperti luka gores atau luka ringan

31	Callusol	Botol	bermanfaat untuk menghilangkan mata ikan, kapalan, atau kutil yang muncul di kulit
32	calortusin syrup	Botol	digunakan untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin
33	Combivent	Strip	bermanfaat untuk meredakan dan mencegah munculnya gejala akibat penyempitan saluran pernafasan
34	Captopril 25mg	Strip	obat yang berfungsi untuk menangani hipertensi dan gagal jantung
35	Carbidu	Strip	untuk mengatasi peradangan dan reaksi alergi
36	Carsida	Strip	membantu meringankan rasa tidak nyaman di lambung karena asam lambung yang berlebihan
37	Caviplex	Strip	untuk membantu memenuhi kebutuhan multi vitamin pada masa pertumbuhan
38	Caviton	Strip	untuk tambal gigi sementara
39	Cefadroxil	Strip	obat untuk mengatasi infeksi bakteri di tenggorokan, saluran kencing, kulit atau jantung.
40	Cefixime	Strip	antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri pada telinga, saluran pernafasan, dan infeksi saluran kemih
41	Cendo Xitrol TM 0.6 cc	Pcs	obat untuk meredakan infeksi mata yang disebabkan bakteri

42	Cendo Xitrol 5 ml	Botol	obat untuk meredakan infeksi mata yang disebabkan bakteri
43	Cetirizine 5mg	Strip	obat untuk mengatasi gejala alergi
44	Ciprofloxacin	Strip	Obat ciprofloxacin mengandung bahan aktif ciprofloxacin Hcl yang memiliki cara kerja menghentikan pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, obat ini bukan digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan virus, seperti common cold (batuk pilek biasa) atau flu
45	Clindamicin 300mg	Strip	Clindamycin bekerja dengan cara memperlambat dan menghentikan perkembangbiakan bakteri. Berkat kemampuan ini, clindamycin dapat mengatasi infeksi bakteri pada paru-paru, kulit, sistem pencernaan, sendi dan tulang, organ kelamin, serta jantung.
46	Crofed	Strip	di gunakan untuk mengobati gejala flu dan allergic rhinitis. Crofed mengandung tripolidine dan pseudoefedrin. Tripolidine adalah obat golongan antihistamin yang memiliki sifat antikolinergik. Obat ini digunakan untuk mengurangi gejala yang terkait dengan alergi.
47	Cloretyl	Botol	digunakan untuk mencegah rasa sakit yang disebabkan oleh suntikan atau operasi bedah minor. Etil klorida ini juga biasa digunakan sebagai solusi kilat untuk mengobati luka ringan dan meringankan nyeri otot akibat keseleo atau terkilir karena olahraga.
48	Co Amoxiclav	Strip	Co Amoxiclav adalah obat kombinasi antara amoxicillin dan asam klavulanat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri yang sudah resisten terhadap amoxicillin tunggal.
49	Colesterol Strip	Strip	Untuk monitor kadar total kolesterol pada darah yang digunakan pada alat

50	Cotton Roll	Roll	untuk memastikan agar mulut terbuka dan menahan agar air liur tidak menetes ke mulut
51	Counterpain 5 g	Tube	Digunakan untuk meredakan nyeri otot dan nyeri sendi ringan akibat arthritis, sakit punggung, dan keseleo. Obat ini mengandung bahan aktif metil salisilat, mentol, dan eugenol.
52	Counterpain 60g	Tube	Digunakan untuk meredakan nyeri otot dan nyeri sendi ringan akibat arthritis, sakit punggung, dan keseleo. Obat ini mengandung bahan aktif metil salisilat, mentol, dan eugenol.
53	Dipenhidramin injeksi	Ampul	digunakan untuk mencegah mabuk perjalanan, meredakan reaksi alergi pada tubuh, seperti mata merah, iritasi, gatal, dan berair; bersin-bersin, serta pilek
54	Dextro 40%	Botol	obat yang membantu memenuhi kebutuhan gula di dalam tubuh. Biasanya, obat ini diberikan pada pasien penderita hipoglikemia, atau kadar gula darah rendah.
55	Demacolin Tab	Strip	mengandung kombinasi obat berupa Paracetamol, Pseudoephedrine HCl, dan Chlorpheniramine maleat. Obat ini digunakan untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin.
56	Dextral Tab	Strip	mengandung kombinasi obat Dextromethorphan HBr, Glyceryl guaiacolate, Phenylpropanolamine, dan Chlorpheniramine maleat. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk.
57	Diapet	Strip	obat herbal untuk mengatasi diare atau mencret, Diapet mengandung bahan aktif daun jambu biji, kunyit, kulit buah delima, dan buah mojokeling. Kombinasi keempat bahan ini dipercaya dapat menangani diare.

58	Dulcolax	Strip	untuk mengatasi sembelit atau susah buang air besar. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet yang diminum dan kapsul yang dimasukkan melalui dubur (supositoria).
59	Domperidone	Strip	Domperidone adalah obat untuk meredakan mual dan muntah
60	Enervon C	Strip	digunakan untuk meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, serta digunakan untuk pengobatan bagi pasien yang kekurangan vitamin B kompleks dan kekurangan vitamin C.
61	Eugenol	Strip	Senyawa eugenol mempunyai aktivitas farmakologi sebagai analgesik, antiinflamasi, antimikroba, antiviral, antifungal, antiseptik, antispasmodik, antiemetik, stimulan, anestetik lokal sehingga senyawa ini banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi
62	Ephinefrin	Ampul	Untuk mengobati reaksi alergi yang dapat membahayakan nyawa, yaitu syok anafilaktik. Alergi yang dapat menyebabkan syok anafilaktik dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti gigitan serangga, kutu, lateks, obat-obatan, dan makanan.
63	Estalex	Strip	digunakan untuk pengobatan gejala-gejala keadaan yang berhubungan dengan spasme muskuloskeletal (kejang otot-otot rangka).
64	Etamox	Strip	Etamox 500 mg adalah antibiotik golongan penicillin yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan bagian atas dan bawah, infeksi saluran kemih, infeksi saluran pencernaan, serta infeksi kulit dan jaringan lunak.
65	Ethyl Chloride	Botol	untuk mencegah rasa sakit yang diakibatkan suntikan, prosedur operasi, cedera olahraga dan nyeri otot mendalam.

66	Fg Troches	Strip	FG Troches adalah obat antibiotik untuk radang tenggorokan dengan kandungan utama fradiomycin dan gramicidin. Kedua bahan dalam FG Troches ini dapat membunuh beberapa jenis bakteri penyebab peradangan di mulut dan tenggorokan.
67	Fresh Care	Pcs	untuk membantu meringankan sakit kepala, perut kembung, masuk angin, mabuk perjalanan, gejala flu dan pegal-pegal.
68	Furosemide	Strip	untuk mengeluarkan kelebihan cairan dari dalam tubuh melalui urine. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi edema (penumpukan cairan di dalam tubuh) atau hipertensi (tekanan darah tinggi)
69	Flamar Salp	Tube	untuk membantu mengurangi nyeri, gangguan inflamasi (radang), nyeri ringan sampai sedang pasca trauma pada tendon, ligamen, otot dan persendian
70	Genoint	Tube	Genoint mengandung obat gentamicin adalah antibiotika golongan aminoglikosida yang digunakan secara luas terutama untuk mengobati infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif, seperti Pseudomonas, Proteus, Serratia, dan Staphylococcus.
71	Genoint SM	Tube	untuk mengobati radang pada mata yang disertai infeksi oleh bakteri tertentu. Genoint salep mata mengandung gentamicin, obat yang termasuk antibiotik golongan aminoglikosida.
72	Gentamicin Salp	Tube	Gentamicin merupakan obat antibiotik golongan aminoglikosida. Obat ini digunakan untuk mengobati radang pada mata yang disertai infeksi oleh bakteri tertentu
73	Gluco Strip	Strip	merupakan strip untuk monitor kadar gula darah untuk digunakan pada alat



74	Glucovance	Strip	Glucovance adalah antidiabetes oral yang mengandung dua obat, yaitu glibenclamide dan metformin. Penggunaannya yang dibarengi diet serta latihan fisik teratur akan mampu membantu kontrol gula darah dengan lebih baik. Glucovance merupakan obat oral yang ditujukan untuk pengobatan diabetes tipe dua
75	Hipavix 5cm x 1m	Roll	HYPAFIX adalah perekat non-woven (jenis tekstil) yang digunakan untuk mengencangkan pembalut luka untuk area yang lebar. Dapat dengan mudah dipotong dan dibentuk sesuai kebutuhan sehingga tidak ada yang terbuang.
76	Hipapix 10cm x 5m	Roll	HYPAFIX adalah perekat non-woven (jenis tekstil) yang digunakan untuk mengencangkan pembalut luka untuk area yang lebar. Dapat dengan mudah dipotong dan dibentuk sesuai kebutuhan sehingga tidak ada yang terbuang.
77	Handscon Steril	Pcs	Handscoon adalah sarung tangan yang biasa di pakai oleh tenaga medis agar terhindar dari droplet pasien. Tujuan Penggunaan Handscoon adalah untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman.
78	Handscon	Pcs	Handscoon adalah sarung tangan yang biasa di pakai oleh tenaga medis agar terhindar dari droplet pasien. Tujuan Penggunaan Handscoon adalah untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman.
79	Hansaplast Plester	Pcs	untuk membantu proses penyembuhan luka ringan seperti luka sayat, luka gores dan luka bakar ringan serta sedang. Obat ini merupakan produk konsumen yang dijual secara bebas
80	hansaplast roll	Roll	untuk membantu proses penyembuhan luka ringan seperti luka sayat, luka gores dan luka bakar ringan serta sedang. Obat ini merupakan produk konsumen yang dijual secara bebas
81	hesmin	Strip	Hesmin adalah obat herbal yang memiliki kandungan Diosmin dan hesperidin sebagai zat aktifnya. Hesmin secara tradisional dapat membantu meringankan gejala wasir.
82	Histigo	Strip	untuk mengobati vertigo, tinitus dan gangguan pendengaran yang terkait dengan penyakit meniere.

83	Hydrocoryson Salp	Tube	untuk meredakan peradangan, mengurangi reaksi sistem kekebalan tubuh, dan mengatasi kekurangan hormon hidrokortison
84	Ibuprofen	Strip	untuk meredakan nyeri dan peradangan, misalnya sakit gigi, nyeri haid, dan radang sendi.
85	Itrabat sirup	Botol	ITRABAT SIRUP mengandung zat aktif Guaiphenesin, Ammonium Chlorida, Chlorpheniramin maleat. Obat ini digunakan untuk mengatasi batuk berdahak dengan cara mengencerkan dahak dan mempermudah pengeluaran dahak dari saluran pernapasan.
86	Insto TM	Pcs	INSTO DRY EYES mengandung zat aktif Hidroxyprophylmethyl selulose dan Benzalkonium Chloride, digunakan untuk mengatasi gejala kekeringan pada mata dengan memberikan efek pelumas seperti air mata.
87	ISDN	Strip	untuk mencegah dan meredakan angina (nyeri dada) akibat penyakit jantung koroner.
88	Kaflam	Strip	obat yang digunakan sebagai pereda nyeri, mengurangi gangguan inflamasi (radang), dismenore, nyeri ringan sampai sedang pasca operasi khususnya ketika pasien juga mengalami peradangan
89	Kalnex	Strip	untuk membantu menghentikan pendarahan seperti pada kondisi mimisan, tindakan operasi, dan menstruasi yang berkepanjangan
90	Keji Beling	Strip	untuk membantu meluruhkan batu ginjal dan batu kandung kemih
91	Ketoconazol Salp	Tube	Obat ini berfungsi untuk mengatasi beragam jenis infeksi jamur di kulit, seperti panu, kurap, kutu air, dan infeksi jamur di bagian tubuh lain, seperti kandidiasis pada vagina

92	Ketoconazol Tab	Ampul	obat anti fungal golongan imidazol yang digunakan untuk terapi infeksi jamur didaerah kulit atau tubuh.
93	Ketorolac injeksi	Ampul	untuk meredakan nyeri dan peradangan. Obat ini sering digunakan setelah operasi atau prosedur medis yang bisa menyebabkan nyeri
94	Lafalost Cream	Tube	untuk rasa nyeri otot dan punggung, nyeri sendi dan keseleo. Obat ini merupakan golongan obat produk konsumen yang dijual secara bebas. Lafalos mengandung mentol, eugenol, metil salisilat, kapsikum oleserin setara dengan kapsalsin, dan vitamin E asetat
95	Lanadexon	Strip	untuk berbagai kondisi inflamasi seperti radang reumatik, radang usus, radang pada ginjal, radang pada mata, radang karena asma dan radang pada tempat lainnya
96	Lidocaine injeksi	Ampul	untuk berbagai kondisi inflamasi seperti radang reumatik, radang usus, radang pada ginjal, radang pada mata, radang karena asma dan radang pada tempat lainnya
97	Lodia	Strip	Merupakan obat antidiare dengan kandungan Loperamid HCl 2 mg. Obat ini dapat digunakan untuk mengobati diare akut dan kronis
98	Loratadine	Strip	dapat mengatasi gejala alergi, seperti bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat, dan ruam kulit yang terasa gatal
99	Masker Kain	Pcs	membantu mengurangi resiko penularan virus
100	Masker Medis	Pcs	mencegah tetesan cairan tubuh yang mengandung virus dan kuman keluar melalui hidung atau mulut
101	Meloxicam 7.5 mg	Strip	obat yang digunakan untuk meredakan gejala penyakit radang sendi atau arthritis, seperti pembengkakan dan nyeri sendi

102	Metronidazole	Strip	bat antibiotik untuk mengobati infeksi. Obat ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan berbagai bakteri dan parasit
103	Metyl Prednisolone	Strip	di gunakan dalam penanganan penyakit paru obstruksi kronik, croup, radang sendi, lupus, psoriasis, colitis ulcerosa, lalergi, gangguan fungsi kelenjar endokrin, gangguan lain pada kulit, mata, paru, lambung, sistem saraf dan <del>ruang sel darah</del>
104	Miconazole Salp	Tube	obat anti jamur yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit, seperti kurap (tinea), kutu air, panu, dan candidiasis. Selain infeksi jamur kulit, miconazole juga digunakan untuk mengobati infeksi jamur di mulut, kuku, atau vagina.
105	Madu Rasa	Sachet	Memiliki manfaat antara lain, pemulih stamina dan energi, antiseptik, menjaga kesehatan otak, obat panas dalam, obat awet muda
106	Microlac	Pcs	Microlax adalah obat yang digunakan untuk mengatasi susah buang air besar atau sembelit. Obat ini tersedia dalam bentuk gel
107	Minyak Kayu Putih 30 ml	Botol	dapat mengurangi perut kembung, sakit kepala, meringankan pernapasan
108	Nacl Infus	Botol	digunakan untuk pengobatan dehidrasi isotonik ekstraseluler, deplesi natrium dan juga dapat digunakan sebagai pelarut sediaan injeksi.
109	Natrium Diclovenax	Strip	di gunakan sebagai pereda nyeri, mengurangi gangguan inflamasi, dismenore, nyeri ringan sampai sedang pasca operasi khususnya ketika pasien mengalami peradangan.
110	Natrium Potassium	Strip	di gunakan sebagai pereda nyeri, mengurangi gangguan inflamasi, dismenore, nyeri ringan sampai sedang pasca operasi khususnya ketika pasien mengalami peradangan.

111	Neuralgin	Strip	digunakan untuk meredakan rasa nyeri ringan hingga sedang, nyeri haid, osteoarthritis dan rheumatoid arthritis. Neuralgin RX mengandung kafein yang mengurangi efek samping rasa ngantuk setelah minum Neuralgin RX.
112	Neuroboran	Strip	digunakan untuk pasien yang kekurangan vitamin B yang dapat mengakibatkan beri-beri dan penyakit yang menyangkut metabolisme lainnya (terutama metabolisme protein), dan kelelahan
113	Neurodex	Strip	digunakan untuk pengobatan kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 seperti pada polineuritis.
114	Neurosanbe	Strip	Vitamin ini digunakan untuk pengobatan defisiensi Vitamin B1, B6, dan B12 yang berkaitan dengan kesehatan saraf, seperti pegal-pegal otot dan kesemutan, serta anemia.
115	New Diatab	Strip	untuk mengatasi gejala diare dan mengurangi frekuensi buang air besar. New Diatabs tersedia dalam bentuk tablet 600 mg. Dalam setiap tabletnya, New Diatabs mengandung 600 mg attapulgite
116	Norit	Pcs	untuk mengobati keracunan dan gangguan pencernaan, seperti perut kembung dan diare. Obat yang berbentuk tablet ini mengandung karbon aktif atau arang aktif.
117	Nebacetin Salp	Tube	merupakan obat yang di gunakan untuk pengobatan penyakit kulit dan mukosa terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri.
118	Oxycan	Botol	digunakan sebagai pertolongan pertama pada penderita asma yang mengalami sesak napas, kelelahan setelah beraktifitas, atau pendaki gunung saat terjadi tekanan udara yang berubah yang mengakibatkan oksigen berkurang.
119	Ondansentron injeksi	Ampul	digunakan untuk mencegah serta mengobati mual dan muntah yang bisa disebabkan oleh efek samping kemoterapi, radioterapi, atau operasi.

120	Ondansetron 8mg	strip	digunakan untuk meredakan mual dan muntah akibat kemoterapi, pencegahan mual dan muntah paska operasi.
121	Omeprazole	Strip	untuk mengatasi gangguan lambung, seperti penyakit asam lambung dan tukak lambung. Obat ini dapat mengurangi produksi asam di dalam lambung.
122	Oralit 200	Sachet	Untuk meredakan dehidrasi, terutama yang disebabkan oleh diare. <b>Oralit</b> aman untuk dikonsumsi oleh siapa saja, baik oleh bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Diare dapat menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi
123	Ottopain	Pcs	mengandung Polimiksin B sulfate, Neomycin Sulfate, Fludrokortison Acetate dan Lidocain HCl. Obat ini digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi pada telinga dengan beberapa gejalanya berupa rasa nyeri, bengkak, gatal dan telinga berair.
124	Paracetamol	Strip	untuk penurun demam dan pereda nyeri, seperti nyeri haid dan sakit gigi. <b>Paracetamol</b> tersedia dalam bentuk tablet 500 mg dan 600 mg, sirup, drop, suppositoria, dan infus.
125	Paratusin	Strip	merupakan obat dengan kandungan Noscapine, chlorpheniramine maleate, glyceryl guaiacolate, paracetamol, dan phenylpropanolamine HCl. Obat ini digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk.
126	Pehacain injeksi	Ampul	digunakan untuk anestesi lokal atau regional, blok saraf, serta anestesi epidural dan kaudal.
127	Pharolit	Sachet	digunakan untuk mencegah dan mengobati dehidrasi akibat diare/ mencret/ muntaber.
128	Prolene	Pcs	merupakan benang kulit yang digunakan untuk menjarit luka
129	Ranitidine injeksi	Ampul	digunakan untuk menangani gejala atau penyakit yang berkaitan dengan produksi asam berlebih di dalam lambung

130	Ranitidine tab	Strip	digunakan untuk menangani gejala atau penyakit yang berkaitan dengan produksi asam berlebih di dalam lambung
131	renovit	Strip	Renovit adalah multivitamin dengan kandungan 12 vitamin dan 13 mineral untuk mendukung proses metabolisme tubuh, serta mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral harian di dalam tubuh. Selain itu, Renovit juga dapat berfungsi: Menjaga daya tahan tubuh. Mempercepat proses penyembuhan saat sakit
132	Rivanol 100 ml	Botol	digunakan untuk membersihkan luka, kompres luka yang membengkak, menghambat perkembangan dan pertumbuhan kuman, membunuh kuman yang berada di luar tubuh, membantu menyembuhkan dan mengeringkan luka, membersihkan dan menyembuhkan bisul.
133	RL Infus	Botol	Digunakan sebagai penambah cairan dan elektrolit tubuh untuk mengembalikan keseimbangannya. Obat ini juga dapat bertindak sebagai alkalisator yang mengurangi keasaman
134	Roverton Syrup	Botol	mengandung ambroxol adalah obat dari golongan mukolitik yang berfungsi untuk mengencerkan dahak yang banyak dan kental hingga menyumbat saluran pernapasan
135	Salonpas Koyo	Pcs	untuk meredakan nyeri pada otot dan sendi yang disebabkan oleh otot yang tertarik, keseleo, dan radang sendi
136	Salp 88	Tube	merupakan obat luar yang mengandung Salicylic acid, Benzoic acid dan Sulfur praecipitatum. Obat ini digunakan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur serta infeksi bakteri ringan seperti panu, kudis, kurap dan kutu air.
137	salonpas jet spray	Botol	merupakan obat semprot yang digunakan untuk meredakan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh terkilir, keseleo, memar, nyeri otot, punggung pegal ataupun sakit pada otot bahu

138	salbutamol	Strip	digunakan oleh penderita asma dan gangguan saluran pernapasan lain, seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Selain itu, salbutamol juga dapat digunakan untuk mencegah sesak napas akibat olahraga.
139	Sanadryl Syrp DMP	Botol	SANADRYL DMP SIRUP 60 ML mengandung zat aktif Dextromethorphan HBr, Difenhidramin HCl, Ammonium Klorida, Natrium Sitrat dan menthol. Obat ini digunakan untuk mengatasi batuk tidak berdahak yang disebabkan karena alergi
140	Sanadryl Syrp Exp	Botol	SANADRYL EXPECTORANT SIRUP mengandung Diphenhydramin HCl, Ammonium Chlorida, Kalium Sulfaguaiakolat, Natrium Sitrat, Menthol, digunakan untuk mengatasi batuk berdahak yang disebabkan oleh reaksi alergi
141	Sangobion	Strip	untuk mengatasi kurang darah atau anemia. Sebagai suplemen penambah darah, Sangobion berisi zat besi yang dapat mencegah dan mengatasi anemia defisiensi besi.
142	Sanmol	Strip	Sanmol mengandung bahan aktif paracetamol. Kandungan ini sering digunakan untuk mengatasi demam dan rasa sakit, seperti sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, dan sakit gigi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan suntik
143	Sanmol Forte	Strip	Obat ini digunakan untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam. SANMOL FORTE merupakan obat dengan kandungan Paracetamol 650 mg.
144	scandexon	Strip	mengandung Dexamethason. Obat ini digunakan untuk mengatasi kondisi seperti inflamasi misalnya radang reumatik, radang usus, radang pada ginjal, radang pada mata, radang karena asma dan radang pada tempat lainnya.
145	Simvastatin 10 mg	Strip	untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dengan kandungan simvastatin 10 mg dan 20 mg.
146	Septocain	Strip	Septocaine Injectable diindikasikan untuk perawatan Anestesi pada prosedur gigi dan periodontal, Glaukoma sudut terbuka dan kondisi lainnya



147	scopma plus	Strip	digunakan untuk meredakan kram perut dan nyeri paroksimal lain pada lambung atau usus. Scopma plus mengandung hyoscine-N-butylbromide dan paracetamol.
148	Sodium Infus	Botol	Cairan ini mengandung natrium dan klorida. Cairan infus ini digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik
149	Spasminal	Strip	untuk mengobati nyeri yang timbul pada keadaan kolik. Spasminal mengandung Metampiron, Pavaperin dan Ekstrak Belladonna.
150	Sprit 3 cc	Pcs	untuk memasukkan cairan obat pada pasien. Biasanya digunakan oleh dokter/ perawat untuk menyuntikan obat ke pasien dalam jumlah banyak
151	Supraptul	Pcs	merupakan kasa steril dengan kandungan antibiotik Framycetin sulphate BP 1%. Kasa ini memiliki aktivitas antibakteri dan merupakan pembalut yang baik untuk digunakan dalam berbagai luka infeksi
152	supravit (vitamin)	Pcs	untuk memelihara kesehatan mata, melancarkan pencernaan dan proses penyerapan mineral, memelihara kulit serta organ pencernaan, pembentukan protein dan menjaga kesehatan sistem syaraf.
153	Teosal	Strip	digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan akibat penyempitan saluran bronkus, seperti asma bronkial dan bronkitis kronis.
154	Tensocrap	Pcs	merupakan perban elastis yang berguna untuk fiksasi/perawatan pada kasus keseleo (sprains), letih otot (strains), dan pelebaran pembuluh darah balik (varicose veins).
155	Uric Acid Strip	Strip	merupakan test strip yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kadar asam urat. Strip Test ini hanya dapat digunakan satu kali pakai dan hanya dapat terbaca melalui alat
156	Urinter	Strip	URINTER merupakan obat dengan kandungan Pipemidic Acid 400 mg. Obat ini digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri gram negatif ataupun bakteri gram positif.

157	Ventolin Nebu	Pcs	Manfaat Ventolin Nebulizer adalah untuk mengobati kondisi-kondisi berikut: Bronkospasme (penyakit asma karena alergi tertentu, asma bronkial, bronkitis asmatis, emfisema pulmonum) dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).
158	Vesperum	Strip	VESPERUM mengandung domperidone adalah termasuk obat golongan antiemetik, yang di gunakan untuk menangani gejala mual, muntah, nyeri perut, serta ketidaknyamanan akibat terlalu banyak makan serta penyakit GERD yang biasa menyebabkan keluhan seperti mulut terasa asam, begah, dan nyeri ulu hati.
159	Vick Vapo	Tube	mengandung zat aktif Minyak Eucalyptus, Menthol dan Camphora. Digunakan untuk mengatasi gejala flu, seperti membantu melegakan pernapasan akibat hidung tersumbat, dapat pula digunakan untuk mengatasi pilek, pegal-pegal dan sakit kepala.
160	Vitacimin	Strip	VITACIMIN merupakan suplemen kesehatan dengan kandungan Ascorbic acid atau Vitamin C dalam bentuk tablet hisap. Suplemen ini digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin c harian, serta membantu menjaga daya tahan tubuh.
161	Vitamin C 25 mg	Strip	merupakan tablet yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin C di tubuh
162	Wiamox	Strip	merupakan obat dengan kandungan Amoxicillin dalam bentuk kaplet. Obat ini digunakan untuk infeksi kulit dan jaringan lunak, saluran pernapasan, saluran kemih dan gonorrhoea.
163	Wing Nidle	Pcs	Wing needle mempunyai fungsi untuk pengambilan darah dan sebagai alat tranfusi cairan dengan gampang melalui pembuluh darah vena
164	Wiros	Strip	Wiros merupakan obat yang mengandung piroxicam. Piroxicam merupakan obat analgetik yaitu obat yang digunakan untuk meredakan nyeri akibat asam urat dan radang sendi.

165	yusimox DS	Botol	Yusimox adalah antibiotik penisilin yang digunakan untuk mengobati infeksi kulit, infeksi pernapasan, infeksi reproduksi dan saluran kemih (genitourinari), serta penyakit gonore
166	Laxarec	Pcs	digunakan untuk mengatasi sembelit kronis, digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam anus. Bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan dan melicinkan dinding rektum-anus sehingga feses mudah keluar.

**LAYANAN KESEHATAN  
DARAT BALI**

<b>ATURAN PEMAKAIAN</b>	<b>PERINGATAN OBAT</b>
di oleskan di area kulit yg terinfeksi sebanyak +- 5x	jika terjadi reaksi alergi segera hubungi dokter, konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan acyclovir salp
200-400mg sebanyak 5x /hari (setiap 4 jam) selama 5-10 hari	jika terjadi reaksi alergi segera hubungi dokter, konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan acyclovir tablet
dipakai sesuai kebutuhan	hindari daerah mata, hidung dan mulut
dipakai sesuai kebutuhan	hindari daerah mata, hidung dan mulut
1-2 kali tergantung usia	konsultasikan kembali dengan dokter jika ruam tidak hilang selama 3 hari
1-2 kali sehari ( dosis konsumsi dapat berubah-ubah disesuaikan berdasarkan tujuan penggunaan	jangan mengonsumsi allopurinol jika memiliki riwayat alergi, harap berhati-hati jika menderita gangguan hati, ginjal, diabetes, hipertensi dan gangguan jantung
2-3 kali sehari (sesuai keluhan)	hentikan pemakaian jika alergi, hindari pemakaian yang memiliki riwayat hipersensitif, tidak digunakan pada ibu hamil
1-3 kali sehari (d disesuaikan berdasarkan usia)	wanita hamil dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, beri tahu dokter jika menderita gangguan ginjal, gangguan hati, infeksi paru, gangguan sistem imun, beri tahu dokter jika mengalami alergi
1-2 kali sehari ( dosis konsumsi dapat berubah-ubah disesuaikan berdasarkan tujuan penggunaan)	jangan berikan kepada anak dibawah usia 6 tahun, jangan mengonsumsi amlodipine bersama dengan vitamin, obat herbal, obat demam, flu, batuk dan asma kecuali diresepkan dokter, jika terjadi reaksi alergi segera hubungi dokter

1-2 kali sehari ( dosis konsumsi dapat berubah-ubah disesuaikan berdasarkan tujuan penggunaan)	jangan berikan kepada anak dibawah usia 6 tahun, jangan mengonsumsi amlodipine bersama dengan vitamin, obat herbal, obat demam, flu, batuk dan asma kecuali diresepkan dokter, jika terjadi reaksi alergi segera hubungi dokter
1-3 kali sehari di sesuaikan berdasarkan usia dan kegunaan	segera hentikan pemakaian obat dan temui dokter jika mengalami efek samping serius, beri tahu dokter jika sedang atau pernah menderita tukak lambung, asma, ginjal, polip hidung, hipertensi
1-2 sachet jika diperlukan	hindari pemakaian jika alergi
1-2 sendok takar 4 kali sehari (sesuai anjuran)	hindari pemakaian jika terdapat alergi, berkonsultasi dengan dokter sebelum pemakaian
2-3 kali sehari sampai habis	segera hubungi dokter jika terjadi alergi, jangan menjalani imunisasi selama menggunakan obat ini kecuali arahan dokter, beri tahu dokter jika mengonsumsi obat apa saja sebelum mengonsumsi amoxicillin
2 kali sehari (sesuai anjuran dokter)	segera hentikan pemakaian obat dan temui dokter jika mengalami efek samping serius, beri tahu dokter jika sedang atau pernah menderita tukak lambung, asma, ginjal, polip hidung, hipertensi
1-2 kapsul sesuai kebutuhan	segera gunakan obat ini setelah di buka dari kemasannya, konsultasikan dengan dokter jika anda sedang hamil, hentikan pemakaian jika alergi
1-2 pcs sesuai kebutuhan	langsung digunakan saat di buka, hindari sinar matahari
1-3 kali sehari di sesuaikan berdasarkan usia dan kegunaan	segera hentikan pemakaian obat dan temui dokter jika mengalami efek samping serius, beri tahu dokter jika sedang atau pernah menderita tukak lambung, asma, ginjal, polip hidung, hipertensi

digunakan 1 pcs	langsung di gunakan saat dibuka, dan tidal bisa di gunakan 2 kali
tidak menentu digunakan jika saat diperlukan	hindari pemakaian jika alergi jangan berikan pada anak dibawah usia 2 tahun
1 kali sehari	gunakan dengan sesuai dosis yang dianjurkan, bila penderita mengeluh gangguan lambung sebaiknya gunakan 1/2 tablet sehari
saat diperlukan	jika terdapat peradangan pada kulit hentikan pemakain
tidak menentu dipakai sesuai kebutuhan dan anjuran dokter	jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi
tidak menentu dipakai sesuai kebutuhan dan anjuran dokter	jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi
tidak menentu dipakai sesuai kebutuhan dan anjuran dokter	jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi
taburkan setiap habis mandi	jika muncul ruam hentikan pemakaian, tidak dugunakan untuk anak di bawah umur 3 tahun
3x sehari (sesuai keluhan dan anjuran dokter	jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika anda sedang hamil
1-2 kali sehari sesuai petunjuk dan anjuran dokter	jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi
di oleskan di area kulit yg terinfeksi sebanyak --+ 5x	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
tidak menentu dipakai sesuai kebutuhan dan anjuran dokter	jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi

di oleskan di area kulit yg terinfeksi sebanyak +- 5x	hentikan pemakaian jika muncul alergi, konsultasi dengan dokter sebelum pemakaian, jangan gunakan di daerah mata, hidung, atau mulut
20ml sebanyak 3-4 kali sehari(sesuai petunjuk dokter)	hindari ada penderita gangguan fungsi hati, jika terdapat reaksi alergi hentikan pemakaian dan konsultasi dengan dokter
akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan respon pasien terhadap obat	beritahu dokter jika menderita penyakit hipertensi, diabetes, jika terdapat reaksi alergi hentikan pemakaian
1-3x sehari (dapat berubah sesuai kegunaan)	hentikan pemakaian jika muncul alergi, harap berhati-hati jika sedang menderita gangguan ginjal
1-3 kali sehari	hindari pada pasien yang memiliki gangguan tiroid, malaria, diabetes, hentikan penggunaan obat ini secara bertahap
1-3 kali sehari (sesuai kebutuhan)	hindari pemakaian jika terdapat alergi, berkonsultasi dengan dokter sebelum pemakaian
1 kali sehari	gunakan dengan sesuai dosis yang dianjurkan, bila penderita mengeluh gangguan lambung sebaiknya gunakan 1/2 tablet sehari
dipakai sesuai kebutuhan	Segera periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi
2x sehari sampai habis	jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain
2 kali sampai habis	jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain, berhati-hati jika menderita anemia
1-2 tetes sebanyak 4-6 kali dalam sehari	setelah menggunakan obat ini pandangan akan terasa sedikit buram tidak disarankan penggunaan dalam jangka panjang, segera konsultasi jika timbul lagi

1-2 tetes sebanyak 4-6 kali dalam sehari	setelah menggunakan obat ini pandangan akan terasa sedikit buram tidak disarankan penggunaan dalam jangka panjang, segera konsultasi jika timbul lagi
1-2 kali tergantung usia	konsultasikan kembali dengan dokter jika ruam tidak hilang selama 3 hari
1 Tablet 2 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Harap berhati-hati dan beri tahu dokter jika sedang menderita gangguan jantung, myasthenia gravis, hipokalemia, gangguan tulang dan sendi, gangguan saraf, serta gangguan mental.
1 Tablet 3-4 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Beri tahu dokter jika Anda memiliki riwayat kolitis, penyakit Crohn, asma, alergi, eksim, gangguan ginjal, gangguan fungsi hati, dan meningitis.
1 Tablet 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	hindari pemakaian jika terdapat alergi, berkonsultasi dengan dokter sebelum pemakaian
tidak menentu dipakai sesuai kebutuhan dan anjuran dokter	hindari pemakaian jika terdapat alergi, berkonsultasi dengan dokter sebelum pemakaian
1 Tablet 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	hindari pemakaian jika terdapat alergi, berkonsultasi dengan dokter sebelum pemakaian
dipakai sesuai kebutuhan	Hanya dapat digunakan saat digunakan dengan mesin yang sama.



dipakai sesuai kebutuhan	
dioleskan pada area yang nyeri maksimal 3-4 kali sehari	Obat ini juga bisa menimbulkan reaksi alergi serius yang disebut syok anafilaktik. Reaksi alergi ini ditandai dengan mual dan muntah, ruam kulit, gatal di sebagian atau sekujur tubuh, bengkak pada wajah, sesak napas, dan kadang-kadang disertai demam.
dioleskan pada area yang nyeri maksimal 3-4 kali sehari	Obat ini juga bisa menimbulkan reaksi alergi serius yang disebut syok anafilaktik. Reaksi alergi ini ditandai dengan mual dan muntah, ruam kulit, gatal di sebagian atau sekujur tubuh, bengkak pada wajah, sesak napas, dan kadang-kadang disertai demam.
sesuai kebutuhan atau harus dengan resep dokter	Pemberian Diphenhydramine yang melebihi dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gejala, seperti kesadaran terganggu; psikosis, kejang, gejala antimuskaridik (misalnya: Midriasis, takikardia, takikaritmia), gagal napas; delirium akut dengan halusinasi visual dan auditori (topikal).
10-20 gram satu dosis secara oral, ulangi dalam 10 menit apabila dibutuhkan.	hindari pemakaian jika terdapat alergi, berkonsultasi dengan dokter sebelum pemakaian
1 Tablet 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, gangguan jantung, diabetes melitus, tidak dianjurkan untuk anak dibawah 2 tahun, wanita hamil dan menyusui.
1 Tablet 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Hati - hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid dan retensi urine. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak di bawah usia 6 tahun, wanita hamil dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter.
2 Tablet 2 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Kebanyakan penderita diare tidak memerlukan pengobatan khusus. Meski begitu, segeralah berkonsultasi dengan dokter bila diare tidak membaik dalam 2 hari atau disertai dengan nyeri perut hebat, BAB berdarah, dan tanda dehidrasi.

1 Tablet 2- 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Dulcolax merupakan obat pencahar yang dijual bebas. Walaupun dijual bebas, hindari menggunakan obat pencahar secara rutin bila terjadi sembelit. Usahakan untuk mengonsumsi makanan tinggi serat terlebih dahulu sebelum menggunakan obat pencahar untuk mengatasi sembelit.
1 Tablet 2- 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Hati-hati menggunakan domperidone bila Anda menderita gangguan ginjal, gangguan hati, penyakit jantung, gangguan elektrolit, tumor pada kelenjar pituitari, serta perdarahan atau sumbatan pada sistem pencernaan.
1 Tablet 1-2 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Kebutuhan dosis Anda mungkin berbeda jika Anda sedang hamil. Jangan minum suplemen ini tanpa memberitahu dokter Anda jika Anda sedang hamil atau berencana untuk hamil.
dipakai sesuai kebutuhan	hindari pemakaian jika terdapat alergi, berkonsultasi dengan dokter sebelum pemakaian
Harus dengan resep dokter	Dapat terjadi gangguan irama jantung jika epinephrine digunakan bersama dengan cisapride, indapamide, atau quinidine; serta meningkatkan tekanan darah bila digunakan bersama linezolid.
1 Tablet 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Dapat mengganggu kemampuan untuk mengemudi atau menjalankan mesin. Gangguan hati. Hamil, laktasi.
1 Tablet 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Alergi terhadap Penisilin atau Sefalosporin, gangguan ginjal, leukemia limfatik, ibu hamil dan menyusui.
dipakai sesuai kebutuhan	hindari pemakaian jika terdapat alergi, berkonsultasi dengan dokter sebelum pemakaian

1 Tablet 4 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Beri tahu dokter jika memiliki alergi terhadap obat golongan aminoglikosida, seperti streptomycin, neomycin, dan amikacin.
dipakai sesuai kebutuhan	jika terkena mata segera cuci mata dengan air mengalir
Harus dengan resep dokter	Beri tahu dokter jika Anda baru menjalani pemeriksaan yang melibatkan penyuntikan zat radioaktif (kontras) ke dalam pembuluh darah vena, sebelum menggunakan obat ini.
dipakai sesuai kebutuhan	jika terkena mata segera cuci mata dengan air mengalir
oleskan 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Hentikan pengobatan bila terjadi iritasi atau sensitisasi. Dapat terjadi pertumbuhan yang berlebihan dari mikroorganisme yang tidak rentan pada pemakaian jangka panjang. Begitu terjadi superinfeksi, hentikan pengobatan dan berikan terapi yang sesuai.
oleskan 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Hentikan pengobatan bila terjadi iritasi atau sensitisasi. Dapat terjadi pertumbuhan yang berlebihan dari mikroorganisme yang tidak rentan pada pemakaian jangka panjang. Begitu terjadi superinfeksi, hentikan pengobatan dan berikan terapi yang sesuai.
oleskan 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Tidak efektif untuk infeksi yang disebabkan oleh jamur atau virus. Penggunaan antibiotik topikal bisa menimbulkan superinfeksi. Jika superinfeksi dan atau iritasi terjadi, segera hentikan pemakaian obat. Jangan digunakan untuk pengobatan jangka panjang.
dipakai sesuai kebutuhan	Hanya dapat digunakan saat digunakan dengan mesin yang sama.

1 Tablet 1 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Informasikan kepada dokter Anda mengenai alergi obat yang Anda miliki, termasuk alergi pada glibenclamide dan metformin ataupun obat lainnya. Glucovance mungkin saja mengandung campuran lain yang berpotensi menyebabkan alergi.
dipakai sesuai kebutuhan	Untuk penggunaan luar. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
dipakai sesuai kebutuhan	Untuk penggunaan luar. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
dipakai sesuai kebutuhan	jangan di buang sembarangan karena dapat beresiko tertular kuman/penyakit
dipakai sesuai kebutuhan	jangan di buang sembarangan karena dapat beresiko tertular kuman/penyakit
dipakai sesuai kebutuhan	Konsultasikan pada dokter untuk ukuran luka yang besar disertai dengan keluarnya cairan atau menunjukkan gejala infeksi.
dipakai sesuai kebutuhan	Konsultasikan pada dokter untuk ukuran luka yang besar disertai dengan keluarnya cairan atau menunjukkan gejala infeksi.
1 Tablet 1-2 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	hentikan pemakaian jika muncul alergi, harap berhati-hati jika sedang menderita gangguan ginjal
1 -2 Tablet 3 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Tidak boleh diberikan pada pasien dengan feokromositoma. Pasien dengan asma, tukak peptik, riwayat tukak peptik. Hamil dan laktasi

oleskan 1-2 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Beri tahu dokter jika alergi terhadap obat kortikosteroid lain, seperti prednisone dan triamcinolone.
1 Tablet 3-4 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	Ibuprofen tidak boleh digunakan pada penderita gagal jantung, gangguan fungsi ginjal dan hati, serta pasien yang hendak menjalani operasi bypass jantung.
Dewasa: 2 sendok takar (10 mL) 3 - 4 kali sehari. Anak 6-12 tahun: 1 sendok takar (5 mL) 3-4 kali sehari.	Setelah minum obat ini tidak boleh menjalankan mesin ataupun kendaraan bermotor, Tidak dianjurkan untuk anak usia dibawah 2 tahun, Keamanan untuk wanita hamil dan menyusui belum dapat dipastikan, Hati-hati penggunaan bagi penderita dengan insufisiensi hati, ginjal dan paru-paru.
1-2 tetes pada setiap mata, 3 kali sehari	Awas!, obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.
2,5–5 mg tiap 15 menit	pemakaian ISDN dalam jangka panjang, atau frekuensi yang sering dapat menyebabkan ketergantungan dan toleransi
2-3 kali sehari atau dengan resep dokter	segera hentikan pemakaian obat dan temui dokter jika mengalami efek samping serius, beri tahu dokter jika sedang atau pernah menderita tukak lambung, asma, ginjal, polip hidung, hipertensi
PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. 1 tablet, 3-4 kali sehari	segera hentikan pemakaian obat dan temui dokter jika mengalami efek samping serius, beri tahu dokter jika sedang atau pernah menderita Gangguan ginjal berat, hematuria, gangguan penglihatan warna, resiko tinggi thrombotic.
2 tablet 2-3 kali sehari atau dengan resep dokter	Segera ke dokter bila mengalami nyeri di area perut disertai mual dan muntah, demam, nyeri saat buang air kecil, terdapat darah dalam urine, atau kesulitan saat buang air kecil.
oleskan 1 sampai 2 kali per hari pada tempat yang infeksi.	Jangan dioleskan pada area mata. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi. Konsultasikan kepada dokter anda apabila sedang hamil, menyusui, dan memiliki riwayat penyakit hati.

1 Tablet 1 kali dalam sehari atau dengan resep dokter	HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Wanita hamil dan menyusui. Penderita dengan gangguan fungsi hati dan Insufisiensi adrenal.
Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter	Jangan memulai, memberhentikan, atau mengganti dosis obat apapun tanpa persetujuan dokter.
3 - 4 kali sehari atau dengan resep dokter	jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi
1 tablet 2-3 kali sehari atau dengan resep dokter	hindari ada penderita gangguan fungsi hati, jika terdapat reaksi alergi hentikan pemakaian dan konsultasi dengan dokter
Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter	Jangan memulai, memberhentikan, atau mengganti dosis obat apapun tanpa persetujuan dokter.
kemudian 1 tablet setiap habis diare/mencret. Maksimal : 8 tablet/hari. Anak >8 tahun : Awal : 1 tablet kemudian sesuai kebutuhan. Maksimal : 4-6 tablet/hari.	Gagal ginjal dan hati, tidak dianjurkan untuk diare akut akibat infeksi
1 tablet 2 kali sehari atau dengan resep dokter	Hati-hati penggunaan pada wanita hamil, menyusui, penderita gangguan hati dan ginjal, dan lansia.
di ganti tiap 4 jam dalam sehari	Setelah selesai digunakan, lepaskan masker dengan cara membuka tali pengikat masker di belakang kepala lalu cuci masker kain dengan air panas dan detergen.
di ganti tiap 4 jam dalam sehari	Setelah selesai digunakan, lepaskan masker dengan cara membuka tali pengikat masker di belakang kepala lalu buang masker ke tempat sampah medis.
Dewasa: 7,5-15 mg per hari. Lansia: 7,5 mg per hari. Anak-anak $\geq$ 60 kgBB: 7,5 mg per hari.	meloxicam berpotensi menyebabkan efek samping, seperti diare, sakit maag, perut kembung, dan gangguan pencernaan.

1 tablet 4 kali sehari atau dengan resep dokter	Segera pergi ke IGD di rumah sakit jika merasakan gejala serius seperti, Mati rasa atau kesemutan pada tangan tau kaki,Perubahan perilaku, Merasa bingung, Sulit berbicara, Gangguan penglihatan, Leher terasa sakit atau kaku, Kejang
1 tablet 2 kali sehari atau dengan resep dokter	Hati-hati pada penderita gagal jantung, diabetes, GI, glaukoma, tiroid, dan hipertensi. Tidak dianjurkan pada wanita hamil dan menyusui.
Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter	Jangan menggunakan miconazole bila Anda memiliki alergi terhadap obat ini atau terhadap obat antijamur golongan azole lainnya, seperti ketoconazole, clotrimazole, itraconazole, dan econazole.
sesuai dengan kebutuhan	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
1 tabung dalam 1 hari	Segera berkonsultasi dengan dokter bila konstipasi terjadi lebih dari 2 minggu, atau disertai BAB berdarah.
sesuai dengan kebutuhan	jika terkena mata segera cuci mata dengan air mengalir
sesuai kebutuhan dan dengan resep dokter	Bila sedang mengonsumsi obat lain, harap beritahukan kepada dokter beberapa obat-obatan yang mungkin menimbulkan interaksi jika dikonsumsi bersamaan dengan NaCl adalah lithium dan tolvaptan.
1 tablet 2-3 kali sehari atau dengan resep dokter	Memiliki riwayat penyakit atau faktor resiko gangguan kardiovaskular, hipertensi, retensi cairan, gagal jantung. Memiliki riwayat penyakit tukak lambung/usus, penyakit Crohn, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, asma, lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Hipersensitif terhadap diklofenak.
1 tablet 2-3 kali sehari atau dengan resep dokter	Memiliki riwayat penyakit atau faktor resiko gangguan kardiovaskular, hipertensi, retensi cairan, gagal jantung. Memiliki riwayat penyakit tukak lambung/usus, penyakit Crohn, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, asma, lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Hipersensitif terhadap diklofenak.

1 tablet 2-3 kali sehari atau dengan resep dokter	hindari penggunaan Neuralgin pada pasien yang memiliki indikasi: Gangguan ginjal, Tukak lambung, Gangguan darah seperti , leukopenia dan agranulositosis.
1 tablet 1 kali sehari	hindari ada penderita gangguan fungsi hati, jika terdapat reaksi alergi hentikan pemakaian dan konsultasi dengan dokter
1 tablet 1 kali sehari	Sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang sedang menerima terapi levodopa
1 tablet 1 kali sehari	Sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang sedang menerima terapi levodopa
2 tablet tiap buang air besar, maksimal 12 tablet dalam sehari	Jangan mengonsumsi New Diatabs bila Anda memiliki alergi terhadap kandungan dalam obat ini.
sesuai kebutuhan atau harus dengan resep dokter	Norit hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Karbon aktif di dalam Norit belum diketahui dapat diserap ke dalam ASI atau tidak. Bila sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa sepengetahuan dokter
di oleskan di area kulit yg terinfeksi sebanyak +- 5x	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
sesuai dengan kebutuhan	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter	jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain



1 tablet 3 kali sehari atau dengan resep dokter	jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain
1 kapsul 3 kali sehari	Omeprazole dapat menyebabkan nyeri perut dan sakit kepala. Segera periksakan diri ke dokter jika muncul efek samping tersebut, terutama bila efek samping tidak mereda meski penggunaan obat sudah dihentikan.
Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter	Beri tahu dokter jika Anda menderita hipertensi, diabetes, gagal ginjal, sirosis, atau penyakit jantung.
PENGGUNAAN OBAT INI HARUS SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. 2-4 x sehari 4-5 tetes	HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Infeksi bakteri purulen akut dan tidak diterapi. Infeksi virus atau jamur pada telinga.
1 tablet 3-4 kali sehari	Jangan mengonsumsi dan menggunakan paracetamol jika memiliki riwayat alergi dengan obat ini.
1 tablet 3-4 kali sehari	Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid dan retensi urin. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia dibawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter.
Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter	Beri tahu dokter jika Anda menderita hipertensi, diabetes, gagal ginjal, sirosis, atau penyakit jantung.
Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
2 ampul dalam sehari atau dengan resep dokter	Jangan menggunakan ranitidine jika Anda memiliki alergi terhadap obat ini dan obat lain yang memiliki golongan yang sama dengan ranitidin, seperti cimetidine dan famotidine.

1 tablet 2-3 kali sehari atau dengan resep dokter	HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hati-hati pemberian pada gangguan fungsi hati, wanita menyusui. Hindarkan pemberian pada penderita dengan riwayat porfiria akut. Pemberian pada wanita hamil hanya jika benar-benar sangat
1 tablet 1 kali sehari atau dengan resep dokter	Jangan minum multivitamin ini melebihi dosis yang telah tertera pada kemasan, atau yang telah ditentukan oleh dokter dan apoteker.
Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
sesuai kebutuhan dan dengan resep dokter	Beri tahu dokter mengenai obat-obatan yang sedang Anda gunakan, baik obat resep, nonresep, suplemen, atau obat herbal. Hal ini dikarenakan beberapa jenis obat mungkin dapat berinteraksi dengan ringer laktat
Anak 5-12 tahun 3 x sehari 5 ml, 2-5 tahun 3 x sehari 2.5 ml, < 2 tahun 2 x sehari 2.5 ml.	HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hamil & laktasi. Tdk boleh digunakan untuk jangka waktu lama.
sesuai kebutuhan dan dengan resep dokter	Harap berhati-hati menggunakan Salonpas jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap kandungan metil salisilat, mentol, dan NSAID
Dioleskan 3x sehari secukupnya pada bagian yang sakit dan gatal	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
Gunakan pada area yang sakit tidak lebih dari 3-4 kali sehari	jika terkena mata segera cuci mata dengan air mengalir

1 tablet 3-4 kali sehar	Jangan menggunakan salbutamol jika Anda memiliki alergi terhadap obat ini dan obat golongan beta2-agonist lainnya, seperti terbutaline.
Dewasa : 3 kali sehari, 2 sendok takar (@10 ml). Anak-anak (6-12 tahun) : 3 kali sehari, 1 sendok takar (@ 5 ml).	Penderita dengan riwayat gangguan fungsi hati, asma dan tekanan darah tinggi. Wanita hamil dan menyusui.
Anak-anak 6-12 tahun : 5 ml, 3-4 kali sehari. Dewasa : 10 ml, 3-4 kali sehari. Atau menurut petunjuk dokter.	Penyakit hati, Asma, Glaukoma, MAOI, Hamil, Anak, Mempengaruhi kemampuan mengemudi/menjalankan mesin.
1 kapsul 1 kali sehari	Produk Sangobion dengan perasa mengandung gula. Oleh karena itu, penderita diabetes perlu berhati-hati dalam menggunakan obat ini.
1-2 tablet 3-4 kali sehari atau dengan resep dokter	Sebelum mengonsumsi Sanmol, beri tahu dokter bila memiliki riwayat penyakit liver, penyakit ginjal, dan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.
1 tablet 3-4 kali sehari atau dengan resep dokter	Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan.
1 tablet 3 kali sehari atau dengan resep dokter	jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain
1 tablet 1 kali sehari atau dengan resep dokter	Simvastatin dapat berdampak buruk pada janin. Oleh karena itu, wanita dalam usia subur dan aktif secara seksual dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang aman saat mengonsumsi simvastatin.
sesuai kebutuhan dan dengan resep dokter	Harap berhati-hati menggunakan Salonpas jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap kandungan metil salisilat, mentol, dan NSAID

1 - 2 tablet 3 kali sehari atau dengan resep dokter	HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Gangguan ginjal, sidrom Gilbert. Hamil dan laktasi, usia lanjut, gangguan jantung, kolitis ulseratif, ileus paralitik, stenosis pilorik, alkohol.
sesuai kebutuhan dan dengan resep dokter	jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain
1 tablet 3 kali sehari atau dengan resep dokter	Penderita kolik diketahui yang mempunyai riwayat hipersensitif atau mengalami reaksi alergi terhadap komposisi obat. Pasien yang memiliki gangguan fungsi hati.
sesuai kebutuhan	jangan membuang jarum dengan sembarangan, buang di tempat yang disediakan agar terhindar dari tertusuk jarum bekas pasien.
sesuai kebutuhan	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
1 tablet 1-2 kali sehari atau dengan resep dokter	hentikan pemakaian jika terjadi alergi
1 tablet 3 kali sehari atau dengan resep dokter	HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Penderita dengan penyakit jantung, hipertensi berat, penyakit hati, epilepsy. Wanita hamil, laktasi, anak-anak di bawah 6 tahun, penderita usia di atas 55 tahun terutama pria dan pada penderita penyakit paru-paru kronik.
sesuai kebutuhan	harus diganti dengan rutin karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit jika pemakaian lebih dari 1 minggu
sesuai kebutuhan	Hanya dapat digunakan saat digunakan dengan mesin yang sama.
1 tablet 1-2 kali sehari atau dengan resep dokter	Jangan menggunakan obat ini pada pasien dengan riwayat hipersensitif atau alergi terhadap Pipemidic acid.

<p>Dewasa dan anak &gt; 14 tahun : 10 - 20 ml. Anak 6 - 14 tahun : 10 ml. Diberikan 2-3 kali/hari. Anak 2 - 6 tahun : 5 - 10 ml. Diberikan 2-3 kali/hari.</p>	<p>Obat ini dapat menyebabkan bronkospasme (penyempitan pada dinding saluran pernafasan), pada penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan hipokalemia, hati-hati apabila digunakan pada pasien gangguan kardiovaskular, pasien hipertiroidisme, hati-hati pada pasien diabetes melitus</p>
<p>1 tablet 3 kali sehari atau dengan resep dokter</p>	<p>jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain</p>
<p>Sesuai dengan kebutuhan atau dengan resep dokter</p>	<p>Jangan ditelan atau dimasukkan ke lubang hidung Jika demam atau sakit berlanjut minta petunjuk dokter.</p>
<p>1 tablet 1-2 kali sehari</p>	<p>Produk ini mengandung Pemanis buatan Sakarin dan sodium siklamat. Tidak boleh dikonsumsi oleh anak berusia di bawah 1 tahun Segmentasi</p>
<p>1 - 2 tablet 3 kali sehari</p>	<p>Mengandung pemanis buatan Sodium Cyclamate dan Sucralose, Produk ini tidak boleh digunakan oleh bayi di bawah 1 tahun, simpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya di bawah suhu 30 derajat C Segme</p>
<p>1 tablet 3 kali sehari atau dengan resep dokter</p>	<p>jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain</p>
<p>sesuai kebutuhan</p>	<p>jangan membuang jarum dengan sembarangan, buang di tempat yang disediakan agar terhindar dari tertusuk jarum bekas pasien.</p>
<p>1 tablet 1 kali sehari atau dengan resep dokter</p>	<p>Wiros merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga pada setiap pembelian dan penggunaannya harus berdasarkan resep Dokter.</p>

<p>Dewasa dan anak-anak: Berat-badan 20 kg ke atas: 250-500 mg/8 jam.</p> <p>Anak-anak: Berat badan 20 kg ke bawah: 20-40 mg/kgBB/hari.</p>	<p>jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain</p>
<p>1 tube dalam sehari</p>	<p>Penggunaan berlebihan dalam waktu lama dapat menyebabkan diare, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit</p>